F.I.R.E22

FUTURE OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY EXPERT PANEL

NOVEMBER 24/25th 2022

MALFORMATIONS VASCULAIRES Le point du vue du radiologue diagnosticien

Milan NAJDAWI

Marc BAZOT, Isabelle THOMASSIN-NAGGARA

APHP Sorbonne Université – Hôpital Tenon

Service d'Imageries Radiologiques et Interventionnelles Spécialisées (IRIS)

Hôpitaux
Universitaires
Est Parisien

T E N O N

MÉDECINE
SORBONNE
UNIVERSITÉ

2 grands types = 2 prises en charges radicalement différentes

Artérielle = HAUT DEBIT

Congénitale

Malformation artérioveineuse

Acquise

**Anomalie vasculaire utérine
(shunts, faux anévrismes)**

Veineuse = BAS DEBIT

Syndrome de congestion pelvienne

**Malformation vasculaire et
lymphatique à bas débit**

2 grands types = 2 prises en charges radicalement différentes

Artérielle = HAUT DEBIT

Congénitale

Malformation artérioveineuse

Acquise

**Anomalie vasculaire utérine
(shunts, faux anévrysmes)**

Urgence vitale potentielle

Veineuse = BAS DEBIT

Syndrome de congestion pelvienne

**Malformation vasculaire et
lymphatique à bas débit**

Douleurs pelviennes chroniques

2 grands types = 2 prises en charges radicalement différentes

Artérielle = HAUT DEBIT

Congénitale

Malformation artérioveineuse

Acquise

**Anomalie vasculaire utérine
(shunts, faux anévrismes)**

Urgence vitale potentielle

2 grands types = 2 prises en charges radicalement différentes

Artérielle = HAUT DEBIT

Congénitale

Malformation artérioveineuse

Exceptionnel (pédiatrie)

Acquise

**Anomalie vasculaire utérine
(shunts, faux anévrismes)**

Traumatisme utérin *(IVG, curetage...)*

**Tumeur trophoblastique
gestationnelle**

(Persiste dans 15% des cas après traitement de la tumeur)

Urgence vitale potentielle

MALFORMATION ARTERIO-VEINEUSE / AVUHD de type SHUNTS ARTERIOVEINEUX

ECHOGRAPHIE

Dilatations vasculaires: structures serpentineuses avec flux (anévrismes cirsoïdes)

Utérus **globuleux asymétrique** avec aspect **spongieux**

Aliasing en Doppler couleur

Flux rapides (**Vmax systolique > 1m/s**)

Faiblement résistif: **IR < 0,5**

Index de pulsatilité bas (0,4 – 0,6)

- 37 ans G2P1 (IMG par curetage)
- hCG négatifs

Dilatations vasculaires: structures serpigneuses avec flux et aspect spongiforme (anévrismes cirsoïdes)

Aliasing en Doppler couleur

Flux rapides (**Vmax systolique > 1m/s**)

Faiblement résistif: IR < 0,5 (elevation du pic de systole et de diastole)

MALFORMATION ARTERIO-VEINEUSE / AVUHD de type SHUNTS ARTERIOVEINEUX**IRM**

Flow voids: structures serpigineuses en hyposignal T2 franc

Réhaussement artériel précoce (> myomètre)

Retour veineux précoce (spécifique): opacification au temps artériel de la veine ovarienne ou utérine de drainage

- 44 ans G4P3
- Antécédent de môle complète aspirée
- hCG négatifs

FAUX ANEURISME

Pathognomonique: visualisation du collet entre l'artère utérine et le pseudo-sac.

Signes négatifs: Pas de structure serpiginieuse (flow-voids), pas de retour veineux précoce

ECHOGRAPHIE

Masse anechogène bien limitée arrondie intra-utérine ou para-utérine

(svt segmt parametrial de l'a. utérine)

Doppler: remplissage uniforme +/- alternatif bidirectionnel

Vmax systolique élevée

IRM

Angio-IRM: Réhaussement artériel parallèle à l'artère utérine

FAUX ANEURISME

FAUX ANEURISME

FAUX ANEURISME

**!!! NE PAS CONFONDRE RETENTION TROPHOBLASTIQUE ET ANOMALIE
VASCULAIRE UTERINE !!!**

Persistence de tissu trophoblastique dans la cavité utérine après arrêt de grossesse (IVG ou fausse couche)

CONTEXTE CLINIQUE

Après une **fausse couche** ou **IVG**

- **Metrorragies** persistantes
- **Élévation persistante et modérée des hCG**

TRAITEMENT

Surveillance

Médicamenteux (Méthylergométrine...)

Curetage et endo-aspiration

IMAGERIE

Examen de référence = **Echographie avec Doppler couleur**

Masse échogène hétérogène

Endo-myométriale

Hypervaculaire en Doppler couleur avec aliasing

Index de résistance bas < 0,5

Vmax systolique moyenne: 0,4 m/s (retenir un seuil empirique max de 1m/s)

Préciser **localisation** et **taille**

IMAGERIE

Examen de référence = **Echographie avec Doppler couleur**

Masse échogène hétérogène

Endo-myométriale

Hypervasculaire en Doppler couleur avec aliasing

Index de résistance bas < 0,5

Vmax systolique moyenne: 0,4 m/s (retenir un seuil empirique max de 1m/s)

Masse endo-myométriale hypervasculaire + hCG élevés = 2 diagnostics à évoquer

- **Rétention trophoblastique:**

Vmax systolique: 0,1-0,5 m/s + hCG peu élevés

- **Tumeur trophoblastique gestationnelle (TTG) +/- avec shunt artério-veineux**

Vmax > 1m/s (shunt) + **hCG très élevés.**

« 30 ans, G1P0, suspicion de MAV post FCS aspirée. Pas de métrorragie. Pas de retour des couches.
hCG à 16 UI, en décroissance progressive. »

Syst. 36.4 cm/s
Diasto. 22.7 cm/s
IR 0.38

Syst. 36.4 cm/s
Diasto. 22.7 cm/s
IR 0.38

Syst. 120.6 cm/s
Diasto. 99.8 cm/s
IR 0.17

**hCG à 16 en décroissance
=
RETENTION TROPHOBLASTIQUE**

Prolifération de villosités anormales et maturation anormale du trophoblaste et cancers dérivés

TERRAIN

Femme en activité génitale (Pic 20-40 ans)

DIAGNOSTIC

Elevation importante (milliers UI/L) des hCG quantitatifs

Sauf certains types histologiques rares avec élévation faible

Imagerie avec Echographie Doppler en 1^{ère} intention

Classification OMS des TTG

Lésion molaire

= présence de villosité choriales

- **Môle hydatiforme (80%)**

- Complète
- Partielle (embryon)

- Môle invasive

Lésion non molaire

= absence de villosité choriales

- **Choriocarcinome**

- Tumeur du site d'implantation
- Tumeur trophoblastique épithélioïde
- Autre plus rares

Prolifération de villosités anormales et maturation anormale du trophoblaste et cancers dérivés

TERRAIN

Femme en activité génitale (Pic 20-40 ans)

DIAGNOSTIC

Elevation importante (milliers UI/L) des hCG quantitatifs

Sauf certains types histologiques rares avec élévation faible

Imagerie avec Echographie Doppler en 1^{ère} intention

Classification OMS des TTG

Lésion molaire

= présence de villosité choriales

▪ Môle hydatiforme (80%)

- Complète
- Partielle (embryon)

▪ Môle invasive

Lésion non molaire

= absence de villosité choriales

▪ Choriocarcinome

- Tumeur du site d'implantation
- Tumeur trophoblastique épithélioïde
- Autre plus rares

strictement endométrial
microkystique
NON VASCULARISEE

=
MOLE HYDATIFORME

CONTEXTE

Post-grossesse molaire (60%): évolution anormale des **hCG**

Metrorragies persistantes après une FCS/IVG (30%) ou grossesse normale/GEU (10%)

Critères diagnostiques d'une TTG maligne post grossesse molaire

- **Plateau du taux d'hCG** sur au moins 4 dosages hebdomadaires successifs sur 3 sem (J1,7,14,21)
- **Augmentation du taux d'hCG** sur au moins 3 dosages hebdomadaires successifs sur 2 sem (J1,7,14)
- **Taux d'hCG détectable** 6 mois après l'évacuation
- **Diagnostic histologique** de choriocarcinome

Biopsie à risque de saignement: traitement sans preuve histologique fréquent

IMAGERIE

DOUBLE COMPOSANTE (évolution synchrone ou décalée)

TUMORALE

*Masse myométriale
Hétérogène/irrégulière
Hypervasculaire*

VASCULAIRE +/- MAV

*Anévrismes cirsoïdes / Flow voids
Aliasing / Vmax > 1m/s
IR bas / IP bas*

MAV Persiste dans 15% des cas après traitement

30 ans, G2P1, vomissements, hCG à 350 000

58cm/s
+58cm/s

145° / 4Hz
Uterus
HH PI 13.20 - 4.90
Gn 2
C2 / M5
FF1 / E1
SRI II 2 / CRI 2

Gn -4.6
Frq low
Qual high
WMF low2
PRF 7.5kHz

CHORIOCARCINOME NON GESTATIONNEL OVARIEN DROIT

F.I.R.E22

FUTURE OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY EXPERT PANEL

NOVEMBER 24/25th 2022

MERCI!

Hôpitaux
Universitaires
Est Parisien

T E N O N

MÉDECINE
SORBONNE
UNIVERSITÉ